Universität Potsdam – Wintersemester 2025/26

# Stoffdidaktik Mathematik

Kapitel 9 - Beispiel: Arithmetisches Mittel

# Stoffdidaktik Mathematik


Kapitel 9 - Beispiel: Arithmetisches Mittel

- Ihr könnt die Strukturierung einer Unterrichtsstunde zum arithmetischen Mittel nachvollziehen.
- Ihr erkennt den Nutzen stoffdidaktischer Analysen und tätigkeitstheoretischer Modelle für die strukturierte Planung von Mathematikunterricht.
- Ihr habt einen Einblick in die Gestaltung von Arbeitsmitteln am Beispiel des arithmetischen Mittels.

# Arithmetisches Mittel




### Ziel: Auswahl und Anordnung von Lerngegenständen




Blick auf einzelne Unterrichtsstunde(n)

Ziel: Gestaltung des Lernprozesses




# Formales




$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n} = \sum_{i=1}^{n} \frac{x_i}{n} = \frac{\sum_{j=1}^{k} H(x_j) \cdot x_j}{\sum_{j=1}^{k} H(x_j)}$$


$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \ldots + x_n}{n}$$

# Formales






# Formales



**Modalwert** 

nominale Daten





Median

ordinale Daten



Wie geht's uns denn heute?

gut so la la schlecht so la la

gut

**Arithmetisches Mittel** 

metrische Daten



124 m 132 m

128 m 150 m 141 m

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \ldots + x_n}{n}$$

# Bedeutung




$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

# fachliche Aspekte

- fiktive Größe
- Vergleichswert
- Prognosewert
- repräsentativer Wert


# spätere Lerninhalte



(Greefrath et al., 2016, S. 251)

(Krüger et al., 2015, S. 56 f.)


# Grundvorstellungen



#### metrische Daten

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$


Vergleichswert repräsentativer Wert





45 km

² km



83 km


?km

# Ausgleichswert

Heiko Etzold, 2025

55 km

2 km



95 km

2 km

82 km

? km


(Krüger et al., 2015, S. 56 ff., 64)

# Kernfragen

**Spannweite** 

Varianz

Standardabweichung





metrische Daten

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

Vergleichswert repräsentativer Wert

**Grundv.:** Wert der gleichm. Verteilung





**Arithmetisches Mittel** 

Wie kann ich das durchschnittliche Ergebnis einer Messreihe **berechnen**?

Wie finde ich einen Wert, der repräsentativ für meine Messreihe ist?

Wie kann ich viele Ergebnisse einer Messreise mithilfe weniger Werte vergleichen?

# Kontext

Lebensweltbezug • Authentizität • Reichhaltigkeit

## Sportliche Leistungen miteinander vergleichen















metrische Daten

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

Vergleichswert repräsentativer Wert

**Grundv.:** Wert der gleichm. Verteilung



**Kernfrage:** Wie kann ich das durchschnittliche Ergebnis einer Messreihe berechnen?




# **題 Motivierung & Zielbildung**




#### **Arithmetisches Mittel**

#### metrische Daten



Vergleichswert repräsentativer Wert

Grundv.: Wert der gleichm. Verteilung



Kernfrage: Wie kann ich das durchschnittliche Ergebnis einer Messreihe berechnen?

Kontext: Sportliche Leistungen miteinander vergleichen

## Lehrziele

Die Schülerinnen und Schüler ...

- ...können das arithmetische Mittel einer Messreihe berechnen.
- ...können erklären, wofür man des arithmetischen Mittel benötigt.

### schlechtere Formulierungen:

- ... kennen das arithmetische Mittel.
- ... wissen, wofür man das arithmetische Mittel benötigt.



Wir wollen lernen, wie man das durchschnittliche Ergebnis einer Messreihe berechnen kann.



# III Motivierung & Zielbildung

Mara und Lasse haben Weitsprung geübt. Wer von den beiden ist besser?

Maras Sprungweiten: 3,20 m; 1,90 m; 3,00 m; 2,90 m

Lasses Sprungweiten: 3,10 m; 2,90 m; 2,70 m; 2,60 m; 3,00 m

### gemeinsam (z. B. Plenum oder Murmelphase)

- Situation analysieren, Vorschläge zur Lösung einholen »Wie kann ich die beiden miteinander vergleichen?« »Was heißt es, besser zu sein?«
- Lernziel herausarbeiten (und ggf. festhalten)

Wir wollen lernen, wie man das durchschnittliche Ergebnis einer Messreihe berechnen kann.

Wir wollen nicht nur herausfinden, wer besser ist, sondern wollen lernen, wie wir das herausfinden.




#### **Arithmetisches Mittel**

metrische Daten

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

Vergleichswert repräsentativer Wert

Grundv.: Wert der gleichm. Verteilung



Kernfrage: Wie kann ich das durchschnittliche Ergebnis einer Messreihe berechnen?

Kontext: Sportliche Leistungen miteinander vergleichen



### Einstiegsalternativen

- realen Wettbewerb durchführen und Daten nutzen
- Daten aus vorherigen Stunden verwenden
- Anzahlen der Messwerte sollten nicht gleich sein
- Messreihe mit mehr Werten sollte keine kleinere Summe haben als andere Messreihe
- Gefahr der Zielverschiebung (Wettbewerb statt Mathematik)

## gemeinsam (z. B. Plenum oder Murmelphase)

- Situation analysieren, Vorschläge zur Lösung einholen »Wie kann ich die beiden miteinander vergleichen?« »Was heißt es, besser zu sein?«
- Lernziel herausarbeiten (und ggf. festhalten)


#### **Arithmetisches Mittel**

metrische Daten

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

Vergleichswert repräsentativer Wert

**Grundv.:** Wert der gleichm. Verteilung



**Kernfrage:** Wie kann ich das durchschnittliche Ergebnis einer Messreihe berechnen?

**Kontext:** Sportliche Leistungen miteinander vergleichen

Lernziel: lernen, wie man das durchschn. Ergebnis einer Messreihe berechnet

## Erkundungsauftrag (z. B. in Partnerarbeit)

- 1. Begründe, warum es nicht ausreicht, die Gesamtstrecken von Mara und Lasse zu vergleichen.
- 2. Zeichne dir die Sprungweiten für Mara in einem geeigneten Maßstab nebeneinander.
  - Überlege anschließend, wie lang die einzelnen Weiten wären, wenn Mara bei jedem Sprung dieselbe Weite gesprungen hätte.
- 3. Wiederhole das Vorgehen mit Lasse und vergleiche anschließend die durchschnittlichen Leistungen der beiden.


#### **Arithmetisches Mittel**

metrische Daten

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

Vergleichswert repräsentativer Wert

**Grundv.:** Wert der gleichm. Verteilung



**Kernfrage:** Wie kann ich das durchschnittliche Ergebnis einer Messreihe berechnen?

**Kontext:** Sportliche Leistungen miteinander vergleichen

Lernziel: lernen, wie man das durchschn.
Ergebnis einer
Messreihe berechnet

## Erkundungsauftrag (z. B. in Partnerarbeit)

## gemeinsam (Plenum)

- Begründung, dass Addieren nicht reicht, kurz besprechen
- Vorgehen bei Mara beschreiben und begründen lassen.
  »Wie bist du vorgegangen?«
- Ergebnis bei Lasse vergleichen
- Allgemeinheit (unabhängig vom Kontext) herausarbeiten. »Was muss man also allgemein tun, wenn man eine Messreihe hat und den durchschnittlichen Wert berechnen möchte?«
- Bezeichner »arithmetisches Mittel« einführen
- Aufschreiben einer Definition und eines Vorgehens zum Bestimmen des arithmetischen Mittels


#### **Arithmetisches Mittel**

metrische Daten

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

Vergleichswert repräsentativer Wert

**Grundv.:** Wert der gleichm. Verteilung



**Kernfrage:** Wie kann ich das durchschnittliche Ergebnis einer Messreihe berechnen?

**Kontext:** Sportliche Leistungen miteinander vergleichen

Lernziel: lernen, wie man das durchschn.
Ergebnis einer
Messreihe berechnet

## möglicher Hefteraufschrieb

### **Arithmetisches Mittel**

Das arithmetische Mittel  $\bar{x}$  beschreibt einen <u>Durchschnittswert</u> einer

Messreihe. Hat man die Messwerte  $x_1, x_2, ..., x_n$ , so gilt:  $\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + ... + x_n}{n}$ 


So geht man bei der Berechnung vor:

- 1. Addiere zuerst alle Messwerte.
- 2. Teile anschließend das Ergebnis durch die Anzahl der Werte.

Beispiel: Sprungweiten 3,20 m; 1,90 m; 3,00 m; 2,90 m

$$\bar{x} = \frac{3,2 + 1,9 + 3 + 2,9}{4}$$

$$= \frac{11}{4} = 2,75$$




#### **Arithmetisches Mittel**

metrische Daten

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

Vergleichswert repräsentativer Wert

**Grundv.:** Wert der gleichm. Verteilung



**Kernfrage:** Wie kann ich das durchschnittliche Ergebnis einer Messreihe berechnen?

**Kontext:** Sportliche Leistungen miteinander vergleichen

Lernziel: lernen, wie man das durchschn.
Ergebnis einer
Messreihe berechnet

## möglicher Hefteraufschrieb

gemeinsam (z. B. Plenum)

- Aufschreiben einer Definition und eines Vorgehens zum Bestimmen des arithmetischen Mittels
- Erstaneignung
  - Beispiel in Anschluss an Definition
  - berechnen und beschreiben
  - Fehler finden und korrigieren

#### **Arithmetisches Mittel**

metrische Daten

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

Vergleichswert repräsentativer Wert

### Aufgaben zur Erstaneignung

Berechne das arithmetisches Mittel.
 Beschreibe anschließend dein Vorgehen.





- a) 2; 4; 3; 7; 8
- **b)** 2,5; 1,2; 5; 7,2

- a) 5; 2; 8; 3; 4
- **b)** 3,1; 1,2; 7; 4,8
- 2. Erkläre, welcher Fehler, beim Berechnen des arithmetischen Mittels der Datenreihe 10; 17; 12; 13; 20 gemacht wurde und korrigiere ihn.


$$\bar{x} = 10 + 17 + 12 + 13 + 20 : 5 = 56$$

3. Beschreibe, wie du beim Berechnen des arithmetischen Mittels mit dem Taschenrechner vorgehen kannst.




## vielfältige Übungen

- zum Teil in Einzelarbeit
- Vergleich z. B. über Lösungszettel
- ggf. Unterbrechung für Besprechung im Plenum



(Leuders, 2009, S. 137 ff.)




#### **Arithmetisches Mittel**

metrische Daten

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

Vergleichswert repräsentativer Wert

**Grundv.:** Wert der gleichm. Verteilung



**Kernfrage:** Wie kann ich das durchschnittliche Ergebnis einer Messreihe berechnen?

Kontext: Sportliche Leistungen miteinander vergleichen

Lernziel: lernen, wie man das durchschn. Ergebnis einer Messreihe berechnet



## Reflexionsfragen mit Bezug zum Lernziel

- »Fasse zusammen, was wir heute neues gelernt haben.«
- »Wofür benötigt man das arithmetische Mittel?«
- »Erkläre, wie man das arithmetische Mittel berechnet.«


#### **Arithmetisches Mittel**

metrische Daten

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

Vergleichswert repräsentativer Wert

**Grundv.:** Wert der gleichm. Verteilung



**Kernfrage:** Wie kann ich das durchschnittliche Ergebnis einer Messreihe berechnen?

**Kontext:** Sportliche Leistungen miteinander vergleichen

Lernziel: lernen, wie man das durchschn. Ergebnis einer Messreihe berechnet


#### **Arithmetisches Mittel**

metrische Daten

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

Vergleichswert repräsentativer Wert

**Grundv.:** Wert der gleichm. Verteilung



**Kernfrage:** Wie kann ich das durchschnittliche Ergebnis einer Messreihe berechnen?

**Kontext:** Sportliche Leistungen miteinander vergleichen

Lernziel: lernen, wie man das durchschn. Ergebnis einer Messreihe berechnet

5'

Motivierung & Zielbildung

Diskussion des Einstiegsbeispiels und Zielformulierung für Stunde

Weitsprung von Mara und Lasse

20′

Stofferarbeitung

Erkundungsauftrag und Handlungen am Beispiel



Verallgemeinerung und Erarbeiten der Berechnungsvorschrift

1. addiere alles, 2. teile durch Anzahl

Erstaneignung (Plenum und Partnerarbeit)

Beispiel, Realisieren, Fehlerfinden

vielfältiges Üben mit differenzierenden Aufgaben

3'

17'

Kontrolle und Bewertung

**Festigung** 

mündliche Zusammenfassung der Stunde, Bezugnahme zum Lernziel

# Literatur

Greefrath, G., Oldenburg, R., Siller, H.-S., Ulm, V., & Weigand, H.-G. (2016). *Didaktik der Analysis. Aspekte und Grundvorstellungen zentraler Begriffe* (F. Padberg & A. Büchter, Hrsg.; 4. Aufl.). Springer Spektrum. <a href="https://doi.org/10.1007/978-3-662-48877-5">https://doi.org/10.1007/978-3-662-48877-5</a>

Krüger, K., Sill, H.-D., & Sikora, C. (2015). *Didaktik der Stochastik in der Sekundarstufe I.* Springer Berlin Heidelberg. <a href="https://doi.org/10.1007/978-3-662-43355-3">https://doi.org/10.1007/978-3-662-43355-3</a>

Leuders, T. (2009). Intelligent üben und Mathematik erleben. In T. Leuders, L. Hefendehl-Hebeker, & H.-G. Weigand (Hrsg.), *Mathemagische Momente* (S. 130-143). Cornelsen. <a href="https://home.ph-freiburg.de/leudersfr/preprint/">https://home.ph-freiburg.de/leudersfr/preprint/</a>
<a href="https://home.ph-freiburg.de/leudersfr/preprint/">2009\_leuders\_intelligent\_ueben\_mathemagische\_momente.pdf</a>

Heiko Etzold, 2025